



# Soyez prêt pour le Coronavirus:

## 6 étapes pour les professionnels du soin

Un nouveau coronavirus (**COVID-19**), identifié en Chine en décembre 2019, a provoqué une épidémie de maladie respiratoire (fièvre, toux et essoufflement). Préparez votre clinique et prévenez la propagation du COVID-19.

### 1 L'essentiel

- Informez les patients et le personnel de santé sur le COVID-19: soulignez l'importance de respecter l'hygiène des mains, l'étiquette de la toux et la distanciation sociale et évitez de toucher les yeux / le nez / la bouche

### 2 Soyez informé

- Vérifiez la situation locale du COVID-19 et les zones à risque connues
- Accrochez des affiches informant les patients sur le COVID-19
- Ajoutez les services WhatsApp de l'Organisation Mondiale de la Santé pour toutes les dernières mises à jour et les informations. WhatsApp "Hi" à +41 79 893 18 92

### 3 Formation

- Élaborez ou révisez les directives d'urgence et de CIP de votre clinique
- Formez votre personnel concernant les symptômes et les directives afin de mieux évaluer, trier et traiter les patients atteints du COVID-19

### 4 Séparer les patients présentant des symptômes (pour le triage dépistez et isolez)

- Placez du personnel à l'entrée pour interroger les patients et les visiteurs sur leurs symptômes, fournissez aux patients symptomatiques des mouchoirs en papier ou des masques pour couvrir la bouche et le nez. Limitez les visiteurs non patients
- Isolez le patient en cas de symptômes : identifiez un espace séparé et bien ventilé qui permet l'isolement et la séparation
- Testez ; ensuite prochaines démarches et transfert sur la base des directives locales
- Encouragez le personnel malade à rester chez eux
- Lorsque vous soupçonnez un cas : ne paniquez pas, signalez le cas au chef d'équipe ou appelez le numéro ci-dessous

### 5 Utilisez le contrôle de prévention des infections (CPI) et l'équipement de protection individuelle (EPI)

- Fournissez des mouchoirs en papier, du savon aux lavabos, des serviettes en papier, un désinfectant pour les mains à base d'alcool (contenant de 60 à 95% d'alcool) et des poubelles fermées dans un établissement de santé
- Assurez une utilisation correcte de l'EPI chez les patients symptomatiques
- Désinfectez votre établissement et nettoyez les surfaces et les objets fréquemment touchés

### 6 Assurez des stocks suffisants

- Assurez un nombre suffisant d'EPI
- Assurez un stock suffisant d'autres fournitures pertinentes (eau, savon, désinfectants, des mouchoirs en papier, etc.)
- Assurez un stock suffisant d'autres fournitures pertinentes (eau, savon, assainisseur et tissus, etc.)

**Lorsque vous soupçonnez un cas, appelez le numéro ci-dessous:**